Akron Children's

متى يجب أن أمكث في المنزل؟

أعاني من الحُمى



ودرجة حرارتي 100.4 درجة فهرنهايت أو أعلى

يمكنني العودة إلى المدرسة عندما أكون:

قد تعافيتُ من الحُمى دون الاعتماد على الأدوية لمدة 24 ساعة (مثل تايلينول (Tylenol)، أو موترين (Motrin)، أو أدفيل (Advil)).

تقيأت أكثر من مرة



خلال الـ24 ساعة الماضية

يمكنني العودة إلى المدرسة عندما:

أصبح متعافيًا من القيء مدة 24 ساعة.

أُصبت بالإسهال أكثر من مرة



خلال الـ24 ساعة الماضية

يمكنني العودة إلى المدرسة عندما:

أصبح متعافيًا من الإسهال مدة 24 ساعة.

لديّ طفح جلدي



طفح جلدي في الجسم مصحوب بإفرازات أو رشح أو حمى

يمكنني العودة إلى المدرسة عندما:

أتعافى من الطفح الجلدي أو الحُمى ويقيم مقدم رعايتي الطبية حالتي، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

أعاني من سعال مستمر



يمكنني العودة إلى المدرسة عندما:

لا يؤثر السعال في أنشطتي المعتادة، و/أو بعد أن يسمح لي مقدم رعايتي الطبية بالعودة إلى المدرسة.

أعاني من التهاب في العين مع إفرازات



خلال الـ24 ساعة الماضية

يمكنني العودة إلى المدرسة عندما:

يسمح لي مقدم الرعاية الطبية بالعودة إلى المدرسة.

لقد كنت في المستشفى



خلال الـ24 ساعة الماضية

يمكنني العودة إلى المدرسة عندما أكون:

قد تعافيتُ من الحُمى دون الاعتماد على الأدوية لمدة 24 ساعة (مثل تايلينول (Tylenol)، أو موترين (Motrin)، أو أدفيل (Advil)).

إذا كان طفلك مصابًا بالتهاب الحلق العقدي أو بعدوى بكتيرية، فينبغي أن يبقى في المنزل حتى يتلقى المضاد الحيوي لمدة 12-24 ساعة على الأقل، أو حتى يسمح مقدم الرعاية الصحية لطفلك بالعودة إلى المدرسة. اطلب الرعاية الطبية عندما يكون طفلك مريضًا، واتبع توصيات مقدم الرعاية الصحية بشأن العودة إلى المدرسة.