

متى يجب بقائي في المنزل؟

لا أستطيع التذوق أو الشم	كنت في المستشفى	أعاني من التهاب في العين	مُصاب بالسعال أو أعاني من صعوبة في التنفس	مُصاب بطفح جلدي	مُصاب بالإسهال	أُتقيأ	مُصاب بالحمى
							
خلال 24 ساعة الماضية	الإقامة في المستشفى أو تلقي العلاج في غرفة الطوارئ أو كليهما	احمرار أو حكة العين أو كل تصرف فيح منها أو كل ذلك	تجنّب تأخير العلاج الطبي إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس	طفح جلدي على الجسم مع رشح ونزح وحمى	خلال 24 ساعة الماضية	خلال 24 ساعة الماضية	درجة حرارتي تبلغ 100 فهرنهايت أو أكثر

سأكون مستعدًا للعودة إلى المدرسة عندما...

يجب عليك الاهتمام بتنفيذ اختبار كوفيد. عليك أيضًا استشارة مقدم الخدمة الطبية قبل العودة إلى المدرسة.	يُسمح لي بمقدم الخدمة الطبية بالعودة إلى المدرسة.	أصبح متعافياً من تصريف القيح و/أو وُقِّمَتْ حالتني من قِبَل مقدم الخدمة الطبية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.	تكون حالتني خضعت للتقييم من قِبَل مقدم الخدمة الطبية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.	أكون تعافيت من الطفح الجلدي أو الحمى وقُيِّمَتْ حالتني من قِبَل مقدم الخدمة الطبية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.	أصبح متعافياً من الإسهال لمدة 24 ساعة.	أتعافى من التقيؤ لمدة 24 ساعة.	أصبح متعافياً من الحمى دون الاعتماد على الأدوية مدة 24 ساعة (مثل Tylenol, Advil, Motrin).
--	---	---	---	---	--	--------------------------------	---

إذا كان طفلك يعاني من التهاب الحلق العقدي أو أي التهاب بكتيري آخر، فيجب إبقائه في المنزل وتناول مضاد حيوي على مدار 24 ساعة على الأقل، وحتى يسمح لك مقدم الرعاية الصحية بعودة طفلك إلى المدرسة. نشجعك على طلب الخدمة الطبية عندما يكون طفلك مريضاً، أو اتباع توصيات مقدم الرعاية الصحية بشأن العودة إلى المدرسة وبشأن الأنشطة الأخرى.