ဘယ်အချိန်မှာ အိမ်မှာနေသင့်လဲ။

Akron Children's

ဖျားနာနေခြင်း



ကိုယ်အပူချိန် 100.4°F နှင့်အထက်ရှိခြင်း

ဖော်ပြပါအချိန်တွင် ကျောင်းပြန်တက်၍ ရပါပြီ-

ဆေးဝါးအကူအညီမပါဘဲ အဖျားပျောက်ကင်းသည်မှာ အချိန် 24 နာရီကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပါက (ဆိုလိုသည်မှာ “Tylenol”၊ “Motrin” နှင့် “Advil” ကဲ့သို့သော အဖျားကျဆေးများ)။

တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး အန်ခြင်း



လွန်ခဲ့သည့် 24 နာရီအတွင်း

ဖော်ပြပါအချိန်တွင် ကျောင်းပြန်တက်၍ ရပါပြီ-

အော့အန်ခြင်းမဖြစ်တော့သည်မှာ 24 နာရီကြာမြင့်ပါက။

တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ဝမ်းလျှောခြင်း



လွန်ခဲ့သည့် 24 နာရီအတွင်း

ဖော်ပြပါအချိန်တွင် ကျောင်းပြန်တက်၍ ရပါပြီ-

ဝမ်းမလျှောတော့သည်မှာ 24 နာရီကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပါက။

အင်ပျဉ်ထခြင်း



ခန္ဓာကိုယ်တွင် အဖုအပိမ့်များ ထွက်ပြီး အရည်ထွက်ခြင်း၊ မျက်ဝတ်ထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် အဖျားရှိခြင်း

ဖော်ပြပါအချိန်တွင် ကျောင်းပြန်တက်၍ ရပါပြီ-

အရေပြားအဖုအပိမ့် သို့မဟုတ် အဖျားမရှိတော့ခြင်း၊ လိုအပ်ပါက ဆရာဝန်က စစ်ဆေးပေးပြီးဖြစ်ခြင်း။

အဆက်မပြတ် ချောင်းဆိုးခြင်း



ဖော်ပြပါအချိန်တွင် ကျောင်းပြန်တက်၍ ရပါပြီ-

ချောင်းဆိုးခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ ပုံမှန် လှုပ်ရှားမှုကို မထိခိုက်ပါက သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူက ခွင့်ပြုထားပါက။

မျက်စိနီပြီး မျက်ဝတ်ထွက်ခြင်း



လွန်ခဲ့သည့် 24 နာရီအတွင်း

ဖော်ပြပါအချိန်တွင် ကျောင်းပြန်တက်၍ ရပါပြီ-

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူက ခွင့်ပြုထားပါက။

ဆေးရုံတက်ခြင်း



လွန်ခဲ့သည့် 24 နာရီအတွင်း

ဖော်ပြပါအချိန်တွင် ကျောင်းပြန်တက်၍ ရပါပြီ-

ဆေးဝါးအကူအညီမပါဘဲ အဖျားပျောက်ကင်းသည်မှာ အချိန် 24 နာရီကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပါက (ဆိုလိုသည်မှာ “Tylenol”၊ “Motrin” နှင့် “Advil” ကဲ့သို့သော အဖျားကျဆေးများ)။

သင့်ကလေးတွင် စထရက်ပ်တိုကော့ကက်စ်ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သော လည်ချောင်းနာခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပါက သို့မဟုတ် ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်းရှိပါက၊ ပဋိဇီဝဆေးစတင်တိုက်ကျွေးပြီး အနည်းဆုံး 12 နာရီမှ 24 နာရီကြာမြင့်သည်အထိ သို့မဟုတ် သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူက သင့်ကလေးအား ကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပြုသည်အထိ အိမ်တွင် နေရပါမည်။ သင့်ကလေးနေမကောင်းဖြစ်ပါက ဆေးကုသမှုခံယူပါ။ ကျောင်းပြန်တက်ရန်အတွက် သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ၏ အကြံပြုချက်များကို လိုက်နာပါ။