


ဘယ်အချိန် အိမ်မှာနေသင့်လဲ။

အဖျားရှိသည့်အခါ



ကိုယ်အပူချိန်
100.4°F နှင့်အထက်

ဖော်ပြပါအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျောင်းပြန်တက်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ - ဆေးဝါးသောက်သုံးခြင်းမရှိဘဲ 24 နာရီကြာသည်အထိ အဖျားမရှိပါက (ဥပမာ၊ တိုင်လီနော(Tylenol)၊ မိုထရင်(Motrin)၊ အဒ်ဗေးလ်(Advil)။


အော့အန်နေသည့်အခါ



လွန်ခဲ့သည့်
24 နာရီ
အတွင်း

ဖော်ပြပါအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျောင်းပြန်တက်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ - အော့အန်ခြင်းမရှိတော့သည်မှာ 24 နာရီကြာမြင့်ပြီဆိုပါက။


ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောသည့်အခါ



လွန်ခဲ့သည့်
24 နာရီ
အတွင်း

ဖော်ပြပါအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျောင်းပြန်တက်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ - ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းမဖြစ်တော့သည်မှာ 24 နာရီကြာမြင့်ပြီဆိုပါက။

အင်ပျဉ်ထနေသည့်အခါ



ကိုယ်ခန္ဓာတွင် အရည်ကြည်ဖုများ၊ အရည်ယိုစီးနေသော ပြည်တည်နာများထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖျားခြင်း

ဖော်ပြပါအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျောင်းပြန်တက်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ - အင်ပျဉ်ထခြင်း သို့မဟုတ် ဖျားခြင်းမရှိတော့လျှင်၊ လိုအပ်ပါက ဆရာဝန်နှင့် သေချာပြန်ပြပြီးလျှင်။


ချောင်းဆိုးနေသည့်အခါ



လွန်ခဲ့သည့်
24 နာရီ
အတွင်း

ဖော်ပြပါအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျောင်းပြန်တက်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ - လိုအပ်ပါက ဆရာဝန်နှင့် သေချာပြန်ပြပြီးလျှင်။


မျက်စိ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသည့်အခါ



လွန်ခဲ့သည့်
24 နာရီ
အတွင်း

ဖော်ပြပါအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျောင်းပြန်တက်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ - မျက်ရည်မကျတော့လျှင် နှင့်သို့မဟုတ် လိုအပ်ပါက သေချာပြန်ပြပြီးလျှင်။

ဆေးရုံတက်နေရသည့်အခါ



လွန်ခဲ့သည့်
24 နာရီ
အတွင်း

ဖော်ပြပါအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျောင်းပြန်တက်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ - ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆရာဝန်က ကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးသည့် အချိန်။

သင့်ကလေးသည် စထရပ်တိုကော့ကပ် ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် လည်ချောင်းနာနေပါက သို့မဟုတ် ဘက်တီးရီးယားပိုး ကူးစက်ခံရပါက ပဋိဇီဝဆေးကို တိုက်ပြီးနောက် အနည်းဆုံး 12 နာရီမှ 24 နာရီကြာသည်အထိ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူက ကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပြုသည်အထိ သင့်ကလေးကို အိမ်တွင် နေခိုင်းသင့်ပါသည်။ သင့်ကလေး ဖျားနာသည့်အခါ ဆေးကုသမှုခံယူပြီး ကျောင်းပြန်တက်ရမည့် အချိန်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ၏ အကြံပြုချက်များကို လိုက်နာပါ။