Akron Children's

کله باید کور کې پاتې شم؟

زه تبه لرم



د 100.4 °F یا لوړه تودوخه

زه چمتو یم چې بیرته ښوونځي ته لاړ شم کله چې زه:

د تبې نه شتون د24 ساعتونو لپاره بې د درملو د مرستې څخه (لکه Tylenol, Motrin, Advil).

زه څو ځله کانګې کوم



په تېرو 24 ساعتو کې

زه چمتو یم چې بیرته ښوونځي ته لاړ شم کله چې زه:

24 ساعته له کانګو څخه پرته.

زه له یو ځل څخه زیات نس ناستی لرم



په تېرو 24 ساعتو کې

زه چمتو یم چې بیرته ښوونځي ته لاړ شم کله چې زه:

24 ساعته له نس ناستې څخه خلاصون.

زه خارښت لرم



د بدن خارښت چې اوبه تري بهیږی، اوبه یا تبه

زه چمتو یم چې بیرته ښوونځي ته لاړ شم کله چې زه:

له خارښت یا تبې خلاص دی او که اړتیا وی زما د طبی متخصص لخوا ارزونه شوې ده.

زه یو دوامداره توخی لرم



زه چمتو یم چې بیرته ښوونځي ته لاړ شم کله:

زما توخیزما د عادی فعالیت سره مداخله نه کوی او/یا ما د طبی تخصص لخوا اجازه ترلاسه کړې.

زما سترګه ګلابی ده او اوبه کوي



په تېرو 24 ساعتو کې

زه چمتو یم چې بیرته ښوونځي ته لاړ شم کله چې زه:

د طبی متخصص لخوا اجازه شوی.

زه روغتون ته تللی یم



په تېرو 24 ساعتو کې

زه چمتو یم چې بیرته ښوونځي ته لاړ شم کله چې زه:

د تبې نه شتون د 24 ساعتونو لپاره بې د درملو د مرستې څخه (لکه Tylenol, Motrin, Advil).

که ستاسو ماشوم د ستریپ ټروټ یا بکتریایی انتان ولری، نو باید تر هغه وخته په کور کې پاتې شی تر څو چې انتی بیوټیک لږ تر لږ 12-24ساعته ورکړل شی یا ستاسو روغتیایی کارکوونکی د ماشوم د ښوونځی ته د راستنېدو اجازه ورکړی. کله چې ستاسو ماشوم ناروغ وی طبی پاملرنې ته مراجعه وکړئ او د خپل روغتیایی متخصص سپارښتنې تعقیب کړئ چې ښوونځی ته بیرته لاړ شئ.