Ni wakati gani ninapaswa kuaa nyumbani?

Akron Children's

Nikiwa na joto jingi mwilini



Joto la 100.4°F au zaidi

Niko tayari kurudi shuleni iwapo:

Sina joto jingi bila usaidizi wa dawa kwa saa 24 (yaani Tylenol, Motrin, Advil).

Nikitapika zaidi ya mara moja



Ndani ya saa 24 zilizopita

Niko tayari kurudi shuleni iwapo:

Sijatapika kwa saa 24.

Nikihara zaidi ya mara moja



Ndani ya saa 24 zilizopita

Niko tayari kurudi shuleni iwapo:

Sijahara kwa saa 24.

Nina upele



Upele wa mwili una usaha, majimaji au nina joto jingi

Niko tayari kurudi shuleni iwapo:

Sina upele au joto jingi na nimefanyiwa uchunguzi na daktari wangu panapohitajika.

Nikiwa na kikohozi kinachoendelea



Niko tayari kurudi shuleni iwapo:

Kikohozi changu hakiathiri shughuli zangu za kawaida na/ au nimeruhusiwa na daktari.

Nikiwa na jicho la waridi na majimaji



Ndani ya saa 24 zilizopita

Niko tayari kurudi shuleni iwapo:

Nimeruhusiwa na daktari.

Nimekuwa hospitalini



Ndani ya saa 24 zilizopita

Niko tayari kurudi shuleni iwapo:

Sina joto jingi bila usaidizi wa dawa kwa saa 24 (yaani Tylenol, Motrin, Advil).

Ikiwa mtoto wako ana maambukizi ya bakteria au koo yenye streptokokasi, anapaswa kukaa nyumbani hadi atumie antibiotiki kwa angalau saa 12-24 au daktari wako amruhusu kurudi shuleni. Mwone daktari iwapo mtoto wako ni mgonjwa na ufuate ushauri wa daktari wako kuhusu wakati wa kurudi shuleni.

08/26 - 5114